Dva noví plži pro Čechy. Polita depressa Sterki.

Polita depressa Sterki. Nalezl jsem tento zajímavý druh r. 1940 na mnoha místech ve středních Čechách. Tato horská *Polita* vyskytuje se hojně hlavně v hlubokých zalesněných údolích, místy jen jednotlivě, místy dosti hojně; přednost dává vlhkým svahovým drtím, řídčeji se vyskytuje na vrcholcích hor v rozvětralém kamení; ve vápencovém Českém Krasu jsem ji také nalezl na porostlých lesních skalách.

Přítomnost tohoto druhu v Čechách je zcela odůvodněna, neboť se vyskytuje v Alpách i Karpatech a byl také zjištěn v Saském Rudohoří (Sächsisches Erzgebirge). Zajímavý je poměrně hojný výskyt v nízkých polohách kolem 200—300 m, ačkoli tato *Polita* je celkem druh horský — hluboká a zalesněná údolí poskytují totiž horským druhům mnohem lepší možnosti rozvoje než suchá, odlesněná parovina, do níž jsou zařízнuta.

Středočeské kusy odpovídají celkem přesně popisu Ehrmannovu (Tierwelt Mitteleuropas). Barva bývá nažloutlá, ale místy nacházíme kusy téměř zcela bezbarvé. *Polita depressa* je u nás celkem málo proměnlivá, jen výška kotouče a poměrná šířka pístěle podléhají individuálním změnám. Nejčastěji můžeme sebrati živé kusy, které po vydatném dešti lezou čile po povrchu údolních drtí. Za suchého počasí nebo na suchých stanovištích bývají živé kusy ukryty hluboko v kamenných drtích. Celkem se způsobem života podobá druhu *Polita glabra* Fér., jenže je daleko více vázána na zalesněné krajiny.

Při soustavném průzkumu středních Čech jsem zjistil, že tento druh je zde značně rozšířen. Nejhojnější je ve středním Povltaví mezi Zbraslaví a Štěchovicemi (zde téměř ve všech postranních údolích), dosti hojný je v Českém Krasu; v Brdech ve Všenorském údolí, u Jinců, na vrcholku Krušné hory u Zdic a v dolním údolí Zbirožského potoka; dále jsem jej zjistil v Posázaví u Senohrab, v dolním Povltaví jsem jej zjistil pouze v Chaberském údolí u Bohnic. — *Politu depressu* jsem sbíral také v severních Čechách v Jizerském údolí nad Turnovem a na Troskách. Zcela chybí ve středním Polabí, v dolním Povltaví (mimo Chabry), na Velvarsku, Kralupsku, Roudnicku, Libochovicku a Slánsku. Jisté je, že *Polita depressa* je v Čechách dosti rozšířena a teprve soustavný sběr z celé země podá přesný obraz jejího výskytu.

Dosti zvláštní je, že nebyla již dříve objevena (hojná v pražském okolí!) — byla patrně pokládána za mladé kusy druhu *Polita glabra* Férussac.

Daudebardia brevipes Draparnaud. Již Uličný (1892) předpovídá výskyt tohoto plže v Čechách. Sbíral jsem tento druh ve dvou exemplářích na dvou lokalitách těsně u Prahy. V červenci 1940 jsem nalezl čerstvě vymělou skořápku v kameništi na dně úžlabiny na Závistském vrchu u Zbraslavi. R. 1941 v červnu jsem nalezl krásný živý exemplář ve Všenorském údolí u Dobřichovic (okraj Brd). Obě naleziště leží asi 250 m vysoko, ještě v teplé oblasti.

Daudebardia brevipes se vyskytuje v Čechách zřejmě jen velmi vzácně, neboť se mi již nepodařilo nalézti žádný další exemplář, ačkoli jsem celé střední Čechy systematicky prozkoumal. Je ovšem pravděpodobno, že žije i na jiných nalezištích, ale vyskytuje se jen jednotlivě a hluboko pod kamením, takže ji většinou sebereme jen náhodou. Živé kusy sedají po déle trvajících deštích na spodní straně kamenů, kde je poměrně nejsnáze spatříme a sebereme. Celkový způsob života je tentýž jako u příbuzného druhu *Daudebardia rufa* Drap., se kterým žije velmi často společně (Závist). Z toho důvodu se domnívám, že tam, kde žije *Daudebardia rufa*, by se mělo pátrati i po *Daudebardii brevipes* se značnou nadějí na úspěch.

Vojen Ložek.