Vallonia enniensis Gredler — nový měkkýš pro Čechy.

V březnu 1945 jsem zjistil v údolí Libušského potoka u Modřan plže *Vallonia enniensis* GREDLER. Sebral jsem jediný, krásně vyvinutý, živý exemplář, který vcelku odpovídá popisu EHRMANNOVU v Tierwelt Mitteleuropas. Od obou našich obecně rozšířených Vallonií (*Vallonia pulchella* MÜLL. a *V. costata* MÜLL.) je tento druh dobře odlišný: tvarem a velikostí skořápky se velice podobá druhu *V. pulchella* MÜLL., avšak závitky jsou napříč jemně žebernatě rýhovány a ústí je mírně skloněno dolů; od druhu *V. costata* MÜLL. se především liší velikostí a rýhováním. *V. costata* MÜLL. má silná kožovitá žebra (25—36 na posledním závitku), kdežto *Vallonia enniensis* GR. má žebra mnohem jemnější a tupá (asi 45—50 na posledním závitku). *Vallonia enniensis* GREDLER byla mnohem lépe známa fossilní ze staršího i mladšího kvartetu pod synonymem *Vallonia costellata* (AL. BRAUN) SANDBERGER; její rozšíření v současné době není dosud dokonale prozkoumáno a v Čechách nebyla recentní ještě sbírána.

Zajímavý je též biotop, na němž byl modřanský exemplář nalezen. Je to údolní dno, porostlé olšemi a jasany, dosti vlhké, s menšími bažinatými úseky. Pozoruhodná je měkkýší associace, obývající toto údolí: *Vertigo angustior* JEFR., *Succinea oblonga* DRAP., *Cochlicopa lubrica* MÜLL., *Zonitoides nitidus* MÜLL., *Perforatella bidens* CHEMNITZ (první naleziště v blízkém okolí Prahy!) a dokonce i sů homilný hlemýžď *Euomphalia strigella* DRAP. Je to biotop, jenž vůbec nevyhovuje našim dvěma běžným Valloniím.

Z nálezu této pro Čechy nové Vallonie, která byla sebrána v těsné blízkosti Prahy, je dobře patrno, jak nutná je revise všech českých Vallonií. V Čechách jsou všeobecně rozšířeny 2 druhy: *Vallonia pulchella* MÜLLER a *V. costata* MÜLLER. JANDEČKA a PETRBOK zjistili v polabských náplavech 2 další druhy: *Vallonia tenuilabris* AL. BRAUN (2 kusy) a *Vallonia adela* WESTERLUND (1 kus). Údaje o výskytu druhu *Vallonia excentrica* STERKI v Čechách by potřebovaly velmi důkladného a přesného ověření s velkým srovnávacím materiálem, neboť rozlišení tohoto plže od velmi podobného druhu *V. pulchella* MÜLL. je nadmíru obtížné. Můj modřanský nález je tedy již vlastně šestým českým druhem z rodu *Vallonia*.

Z tohoto výčtu vidíme, že všechny čtyři, oproti dílu ULIČNÉHO nové Vallonie byly sebrány jen jednotlivě a že jsou v Čechách velmi vzácné; je však velmi pravděpodobné, že i tyto vzácné druhy budou jistě hojněji rozšířeny a že se najdou místa, kde budou žít v bohatých populacích. Na tuto otázku nám odpoví jedině soustavné sběry ze všech krajů naší země a přesná revise všech nálezů.

VOJEN LOŽEK.